

2024
CAMPANHA DE VACINAÇÃO

QDENGGA

A Mútua dos Magistrados, em atenção à saúde de seus associados, oferecerá a **vacina Qdenga, uma proteção essencial contra a dengue.**

Vacina tetravalente, composta por vírus atenuado e contendo quatro sorotipos. Oferece defesa em relação a esses sorotipos, reduzindo a gravidade de doenças e controlando surtos. Segundo o Ministério da Saúde, **o aumento do número de casos e o risco para epidemias ocorre principalmente entre os meses de outubro e maio.**

Público-alvo:

Vacina indicada para indivíduos de 04 anos a 60 anos. **Porém, a campanha da Mútua tem como público-alvo associados com idade de 18 anos a 60 anos**, que receberão duas doses para uma imunização completa, com intervalo de 3 meses.

Local: Somente no **CDT do Centro.**

Datas de Vacinação:

Primeira dose: 22, 23 e 24 de outubro de 2024

(terça, quarta e quinta-feira)

Segunda dose: 28, 29 e 30 de janeiro de 2025

(terça, quarta e quinta-feira)

Horário: Das 10h às 15h

Agendamento:

- É necessário agendamento prévio;
- Disponibilizamos **66 vagas por dia.**
- Para agendar, ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp para: **98552-1774** ou **98552-1844.**

Contraindicações da Vacina Qdenga:

1. Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer excipiente listado na composição ou hipersensibilidade a uma dose anterior de Qdenga.

2. Gravidez e Amamentação: Não recomendada para mulheres grávidas ou que estejam amamentando.

3. Imunodeficiência primária ou adquirida: Indivíduos com condições que afetam o sistema imunológico, tais como HIV avançado ou em tratamento imunossupressor (terapias).

4. Doenças Agudas: Febre ou doenças agudas graves devem ser tratadas antes da vacinação.

Reações Adversas Conforme Bula da Vacina:

| Classe de sistema de órgãos | Frequência | Reações adversas |
|---|----------------------|--|
| Infecções e infestações | Muito comum | Infecção das vias aéreas superiores ^a Nasofaringite Faringotonsilite ^b Bronquite Rinite |
| | Comum | |
| | Incomum | |
| Distúrbios do sistema imunológico | Desconhecida | Reação anafilática ^c |
| Distúrbios metabólicos e nutricionais | Muito comum | Diminuição do apetite ^d |
| Distúrbios psiquiátricos | Muito comum | Irritabilidade ^d |
| Distúrbios do sistema nervoso | Muito comum | Cefaleia Sonolência ^d Tontura |
| | Incomum | |
| Distúrbios gastrointestinais | Incomum | Diarreia Náusea Dor abdominal Vômito |
| Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo | Incomum | Erupção cutânea ^e Prurido ^f Urticária Angioedema |
| | Muito rara | |
| Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo | Muito comum Comum | Mialgia Artralgia |
| Distúrbios gerais e condições do local de administração | Muito comum | Dor no local da injeção Eritema no local da injeção Mal-estar Astenia Febre Inchaço no local da injeção Equimoses no local de injeção ^f Prurido no local de injeção ^f Síndrome gripal Hemorragia no local da injeção ^f Fadiga ^f Alteração da cor no local da injeção ^f |
| | Comum | |
| | Incomum | |

a. Inclui infecção das vias aéreas superiores e infecção viral das vias aéreas superiores

b. Inclui faringotonsilite e tonsilite

c. Reações adversas observadas em experiência pós comercialização

d. Coletadas em crianças com menos de 6 anos de idade em estudos clínicos

e. Inclui erupção cutânea, erupção cutânea viral, erupção cutânea maculopapular, erupção cutânea pruriginosa

f. Relatada em adultos em estudos clínicos.

Importante:

As reações são, em geral, leves a moderadas e tendem a desaparecer em poucos dias. Os vacinados devem permanecer no local da vacinação por 30 minutos, para monitoramento de reações adversas mais graves, embora essas sejam raras.

E por isso, haverá uma ambulância disponível durante os dias de vacinação como medida de precaução, garantindo a segurança de todos.

A vacina não deve ser administrada concomitantemente com outras vacinas.

Observações:

Para quem já realizou anteriormente o esquema vacinal com as duas doses da Qdenga, não há recomendações de reforço.

A Mútua dos Magistrados reafirma seu compromisso com a saúde de seus associados, incentivando todos a aproveitarem esta oportunidade de se vacinar e se proteger contra a dengue. Juntos, podemos fortalecer a saúde coletiva e contribuir para um ambiente mais seguro.

Informações adicionais conforme SBIM (Sociedade Brasileira de Imunizações):**1. Eu já tive dengue. Quanto tempo após a dengue posso tomar a vacina?**

Esse dado especificamente não foi avaliado no estudo dessa vacina. Mas, com base na produção dos anticorpos e em dados de vacina semelhante anterior, o tempo ideal entre o episódio da dengue e o início da vacinação é de 6 meses. Em revisão feita por Guy e colaboradores (Vaccines (Basel). 2020 Apr 9;8(2):174. DOI: 10.3390/vaccines8020174), não deve ser feita com menos de 30 dias, mas após 3 meses, já há benefício.

2. Quem já teve dengue pode tomar a vacina?

Sim, quem já teve dengue pode tomar a vacina. A recomendação da vacina nesta população é especialmente indicada por ter melhor resposta imune à vacina e por ser população de maior risco para dengue grave.

3. Essa vacina pode ser aplicada junto com outras vacinas? Há necessidade de intervalo com alguma vacina?

Foi estudada a concomitância com as vacinas da hepatite A e Febre Amarela e não houve relato de eventos adversos até o momento. Pelo fato de ser vacina de vírus vivo, existe a possibilidade de interferência imune na resposta da vacina, assim, sempre que possível, respeitar intervalo de 30 dias entre estas vacinas, desde que não tenha sido feita no mesmo dia.

4. Tomei duas doses da vacina Dengvaxia®, mas não completei o esquema? Como proceder?

O esquema iniciado com uma determinada vacina, deverá ser completado com o mesmo produto, como regra geral. Na indisponibilidade de vacina ou em situações de interrupção de esquema prévio com Dengvaxia®, pode-se realizar QDENGGA®, desde que complete duas doses da mesma, com intervalo habitual de 90 dias.

5. Tem valor tomar a vacina Qdenga® se já completei todo o esquema com a vacina anterior, Dengvaxia®?

Não há dados de segurança que sustentem esta recomendação, por ora.

6. E para as pessoas acima de 60 anos? Existem dados?

Os dados de imunogenicidade e segurança estão em andamento. Assim, até que haja a disponibilidade dos dados, não recomendamos fazer a vacinação fora da faixa etária recomendada. Atualmente, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), agência regulatória da Argentina, aprovaram o uso de QDENGGA® a partir de 4 anos, sem limite superior de idade, considerando os potenciais benefícios da vacina nessa população (idosa, com comorbidades), em geral mais suscetível às formas graves da doença. Assim, a recomendação para indivíduos 60+ deve ser encarada como uma indicação "off label", a critério médico, respaldada pela aprovação por outras agências regulatórias, mas sem dados que atestem a segurança e a eficácia.

7. Mulher em idade reprodutiva pode ser vacinada ou deve ter algum cuidado especial?

Mulheres que estão em idade fértil, e pretendem engravidar, deverão ser orientadas a usar métodos de anticoncepção, por período de 30 dias após a vacinação.

8. Qual o nível de proteção oferecido após a administração da primeira dose e por quanto tempo duraria?

Foi demonstrada eficácia de 81% após 30 dias da primeira dose da vacina, o que poderia justificar seu uso para indivíduos que vivem em áreas não endêmicas que vão visitar países endêmicos e não têm tempo para receber a segunda dose antes da viagem. Mas a proteção de médio e longo prazo apenas foi demonstrada com o esquema preconizado de duas doses (intervalo de 3 meses), uma vez que 95% da população do estudo completou esse esquema.

CDT do Centro:

Rua Dom Manuel, 29, 5º andar - sala 510B
Prédio do Museu da Justiça - Centro - RJ

A Diretoria

Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro

Deixe a Mútua cuidar de você!